



| | 寶寶健康疫苗計劃 | 寶寶全面疫苗計劃 | 寶寶專貴疫苗計劃 | 寶寶星級疫苗計劃 |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | 4針 + 2劑口服 | 6針 + 2劑口服 | 10針 + 2劑口服 | 16針 + 2劑口服 |
| 2個月 | 口服輪狀病毒疫苗 (第一劑) 乙型流感嗜血桿菌疫苗 (第一針) | 六合一疫苗 (第一針) 口服輪狀病毒疫苗 (第一劑) | 六合一疫苗 (第一針) 口服輪狀病毒疫苗 (第一劑) | 六合一疫苗 (第一針) 口服輪狀病毒疫苗 (第一劑) 13價肺炎鏈球菌疫苗 (第一針) |
| 4個月 | 口服輪狀病毒疫苗 (第二劑) 乙型流感嗜血桿菌疫苗 (第二針) | 六合一疫苗 (第二針) 口服輪狀病毒疫苗 (第二劑) | 六合一疫苗 (第二針) 口服輪狀病毒疫苗 (第二劑) | 六合一疫苗 (第二針) 口服輪狀病毒疫苗 (第二劑) 13價肺炎鏈球菌疫苗 (第二針) |
| 6個月 | 乙型流感嗜血桿菌疫苗 (第三針) | 六合一疫苗 (第三針) | 六合一疫苗 (第三針) | 六合一疫苗 (第三針) 13價肺炎鏈球菌疫苗 (第三針) |
| 9個月 | | | 腦膜炎雙鏈球菌疫苗 (第一針) | 腦膜炎雙鏈球菌疫苗 (第一針) |
| 1歲 | | 兒童甲型肝炎疫苗 (第一針) | 四痘混合疫苗 (第一針) 兒童甲型肝炎疫苗 (第一針) 腦膜炎雙鏈球菌疫苗 (第二針) | 13價肺炎鏈球菌疫苗 (第四針) 日本腦炎疫苗 (第一針) 四痘混合疫苗 (第一針) 兒童甲型肝炎疫苗 (第一針) |
| 1歲半 | 乙型流感嗜血桿菌疫苗 (第四針) | 五合一疫苗 (第四針) 兒童甲型肝炎疫苗 (第二針) | 五合一疫苗 (第四針) 兒童甲型肝炎疫苗 (第二針) 四痘混合疫苗 (第二針) | 腦膜炎雙鏈球菌疫苗 (第二針) 五合一疫苗 (第四針) 兒童甲型肝炎疫苗 (第二針) |
| 2歲 | | | | 日本腦炎疫苗 (第二針) 四痘混合疫苗 (第二針) |

六合一疫苗

六合一疫苗是一種包含白喉、破傷風、無細胞型百日咳、滅活小兒麻痺、乙型流感嗜血桿菌及乙型肝炎的混合疫苗。

五合一疫苗

五合一疫苗則混合了白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺和乙型流感嗜血桿菌五種疫苗成分。

口服輪狀病毒疫苗

輪狀病毒具高度傳染性，可經物體表面及日常環境中傳播，是全球引致兒童腹瀉的最常見病因之一。此病毒會導致嬰兒發燒、嘔吐和水狀腹瀉，情況一般更會持續3-7。嬰兒偶然更會出現嚴重脫水的情況。建議嬰兒於出生後6-24週內完成接種共2劑的口服疫苗。

13價肺炎鏈球菌疫苗

肺炎球菌具高度傳染性，常見於上呼吸道，可引致嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌疾病如入血性肺炎、敗血病和腦膜炎。幼兒及長者患上侵入性肺炎球菌疾病後病情通常較為嚴重。建議嬰兒於出生後6週可接種此疫苗。

日本腦炎疫苗

日本腦炎主要經蚊子傳播。日本腦炎主要流行於亞洲及西太平洋地區。此病一般不帶顯著病徵，病情嚴重者則病發得快，並出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、震顫、抽搐 (尤其是幼童) 及癱瘓等症狀，甚至死亡。建議須經常往反內地的嬰兒於1歲可選擇接種此疫苗。

腦膜炎雙鏈球菌疫苗

腦膜炎雙球菌感染是一種經由直接接觸感染者口鼻分泌物飛沫而傳播的嚴重細菌性疾病，可導致敗血症及腦膜炎，嚴重者可以致命。建議須經常往反內地的嬰兒可選擇接種此疫苗。

四痘混合疫苗

四痘混合疫苗能有效預防四種病毒的感染 - 麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹和水痘。建議嬰兒於1歲可選擇接種此疫苗。



尖沙咀美麗華廣場A座6樓603室
(港鐵尖沙咀站B2出口)



2507 5808



2657 1336



A63198861



专科及内视镜中心 兒童疫苗計劃



 尖沙咀美麗華廣場A座6樓603室
(港鐵尖沙咀站B2出口)

 2507 5808  2657 1336

 eminencedrwing@gmail.com

